



## ***Inés Bedo***

<b>Datos de contacto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Av Medrano 134 piso 6 Caba. Bs As. Argentina. Cód. Postal C1179AAB.</li><li>• tel 054 011 4983 1589.</li><li>• Email: mariaines83b@hotmail.com</li></ul>
<b>Educación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Médica, Universidad de Bs. As. 2010</li><li>• Residencia en diabetología. Bs As Malvinas Argentinas.2015.</li><li>• Curso Superior de Medicina interna. Universidad de Bs As. 2015</li><li>• Especialización en nutrición, Universidad Católica, 2014.</li><li>• Disposición 6677/10 ANMAT, IMOBA, Junio 2019.</li><li>• Buenas prácticas clínicas, Eli Lilly 2019.</li><li>• Buenas Prácticas Clínicas The Global Health Network, Octubre 2021.</li><li>• Diplomatura en Buenas Practicasen Investigación Biomédicas. Universidad de San Pablo.Tucumán. de Agosto 2020 a Julio 2021(238 horas).</li></ul>
<b>Información laboral actual</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Investigaciones Médicas IMOBA SRL</b> Av Medrano 134 piso 6 CABA Médica investigadora desde 2019 hasta la actualidad.</li><li>• <b>Centro de diabetes Dr. Maggio Malvinas Argentinas</b> Médica diabetologa,prevención y curación pie diabético, desde 2011 hasta la actualidad.</li></ul>
<b>Matricula</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MN 138261</li><li>• MP 59061</li></ul>
<b><i>Estudios clínicos realizados en los últimos 5 años</i></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ K-877-302 Prominent Pema fibrato para reducir los desenlaces cardiovasculares reduciendo los triglicéridos en pacientes con diabetes. Desde 2019 hasta la actualidad. Fase III. Quintiles. Sub investigador</li><li>➤ I8F-MC-GPGM Eficacia y seguridad de Ly3298176 una vez por semana vs insulina glargina en ptes con diabetes tipo 2 y riesgo cardiovascular elevado.</li></ul>

**Estudios Clínicos  
realizados en los  
últimos 5 años.**

Desde marzo 2019 hasta Julio de 2021. Fase III. Eli Lilly. Sub investigadora

- I8F-MC-GPGH: Estudio randomizado, abierto de Fase 3 que compara el efecto de LY3298176 vs insulina Degludec titulada en el control glucémico de los ptes. con diabetes tipo 2. Eli Lilly. Desde julio 2019 hasta Abril 2021. Fase III. Eli Lilly. Sub investigadora
- I8F-MC-GPGL: Ensayo randomizado, abierto, de fase 3, que compara la eficiencia y seguridad de Tirzepatida, vs Semaglutida una vez por semana como terapia adicional a la metformina en pacientes con DBT tipo 2. Eli Lilly. Desde Julio 2019 hasta Abril 2021. Fase III. Eli Lilly.
- LPS15017: Premix, estudio de fase 3 para comparar iglarLixi con la mezcla de insulina en ptes con DBT tipo 2. Sanofi Aventis. Desde 2019 hasta 2020. Sanofi. Fase III. Sub investigadora
- LPS15396 / ARTEMIS-DM: Un estudio de fase IV multicéntrico, multinacional, prospectivo, intervencionista, de un solo brazo que evalúa la eficacia clínica y la seguridad de 26 semanas de tratamiento con insulina glargina 300 U / ml (Gla-300) en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 no controlada con insulina basal. Desde 2019 hasta 2020. Sanofi Aventis. Sub investigadora.
- 8H-MC-BDCL Un ensayo de fase 2 paralelo, controlado por campaña para evaluar la seguridad y eficacia de LY3209590 en insulina nativa con diabetes mellitus tipo 2. Eli Lilly. Sub investigadora. Desde noviembre de 2020 hasta la actualidad.
- I8F-MC-GPHM Eficacia y seguridad de tirzepatida una vez por semana frente a placebo después de un programa de estilo de vida intensivo Participantes sin diabetes tipo 2 que tienen obesidad o sobrepeso con comorbilidades relacionadas con el peso: ensayo aleatorizado doble ciego controlado con placebo. Sub investigadora. Desde abril de 2021 hasta la actualidad.
- I8F-MC-GPHD Ensayo aleatorizado, fase 3, abierto que compara el efecto de la adición de tirzepatida una vez a la semana frente a insulina lispro (U100) tres veces al día en participantes con diabetes tipo 2 no controlada adecuadamente con insulina glargina (U100) con o sin metformina. Sub investigadora. Desde diciembre de 2020 hasta la actualidad

Firma:

Fecha: